

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Викс АнтиГрип Комплекс 500 mg/200 mg/10 mg прах за перорален разтвор
Vicks AntiGrip Complex 500mg/200mg/10mg powder for oral solution

парацетамол/гвайфенезин/фенилефринов хидрохлорид
(paracetamol/guaifenesin/phenylephrine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това е необходимо да използвате Викс АнтиГрип Комплекс внимателно, за да имате най-добри резултати от лечението с него.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или съвет.
- Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Комплекс и за какво се използва
2. Преди да приемете Викс АнтиГрип Комплекс
3. Как да приемете Викс АнтиГрип Комплекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Комплекс
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20150197
Разрешение №	36712 / 23.02.2017
Одобрение №	IA2-7986 / 22.02.2017

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Викс АнтиГрип Комплекс е предназначен за облекчаване на симптоми на настинка и грип. Той съдържа три активни съставки:

- парацетамол е добре известен болкоуспокояващ продукт (аналгетик). Той е ефективен срещу болки, включително главоболие и възпалено гърло, и може също да понижава температурата (антипиретик).
- гвайфенезин (като експекторант) разводнява секрета, което помага да се облекчи гръдната кашлица;
- фенилефринов хидрохлорид (назален деконгестант) намалява отока на носните проходи и така облекчава запушения нос.

Трябва да използвате Викс АнтиГрип Комплекс, само ако имате болка/или висока температура, запушване на носа и гръдна кашлица.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС

Не приемайте Викс АнтиГрип Комплекс:

- ако сте алергични към парацетамол, гвайфенезин, фенилефринов хидрохлорид или някоя от останалите съставки (вижте точка 6);
- ако имате сърдечно заболяване;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония);
- ако имате проблем с черния дроб или тежко бъбречно заболяване;
- ако имате свръхактивност на щитовидната жлеза;
- ако сте диабетик;



- ако имате глаукома (повишено налягане в окото) от тясноъгълен тип;
- ако имате порфирия, което е наследствено нарушение, характеризиращо се с прекомерно количество пигменти в урината;
- ако приемате трициклични антидепресанти;
- ако приемате бета-блокери;
- ако приемате моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон или сте ги приемали през последните 14 дни;
- ако приемате лекарства за намаляване на кръвното налягане или за лечение на стенокардия.

Не давайте Вискс АнтиГрип Комплекс на деца под 12-годишна възраст.

Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други продукти, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се потърси медицинска помощ в случай на предозиране, дори когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане. Да не се приема едновременно с други продукти за лечение на грип, настинка или запушен нос.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вискс АнтиГрип Комплекс:

- ако имате проблем с чернодробните функции;
- ако сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- ако имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- ако имате продължителна или хронична кашлица като тази при пушачи, астма, хроничен бронхит или емфизем.

Употреба на други лекарства

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вискс АнтиГрип Комплекс, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива лекарства, не приемайте Вискс АнтиГрип Комплекс.
- моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. **Не приемайте Вискс АнтиГрип Комплекс, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни.**
- трициклични антидепресанти за депресия, като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за високо кръвно налягане (антихипертензивни продукти), включително бета-блокери или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на нередовен сърдечен ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- фенотиазини (които се използват или като антипсихотични лекарства за лечение на състояния като шизофрения или параноя, или за предотвратяване на гадене и повръщане);
- лекарство за гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарство за разреждане на кръвта (антикоагуланти), като варфарин или други кумарини;
- лекарство за висок холестерол (като холестирамин);
- седативи (барбитурати);
- пробенецид или азидотимидин (зидовудин);
- изониазид (използван за лечение или предотвратяване на туберкулоза).

Прием на Вискс АнтиГрип Комплекс с храни и напитки

Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

Прием на Вискс АнтиГрип Комплекс по време на бременност или кърмене не се препоръчва: консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба.



Шофиране и работа с машини

Този продукт може да причини замайване или объркване. Ако сте засегнати, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация за някои от съставките на Викс АнтиГрип Комплекс

Този продукт съдържа:

- аспартам (E951), източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия.
- захароза. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемате този лекарствен продукт.
- натрий (157 mg на доза). Да се има предвид от пациенти на контролиран прием на натрий.

3. КАК ДА ПРИЕТЕ ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС

Винаги приемайте Викс АнтиГрип Комплекс точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт; консултирайте се с тях, ако не сте сигурни в нещо.

Дозировка

Това лекарство е прах, който трябва да бъде разтворен във вода и приет като топла напитка. Изсипете едно саше от праха в чаша със стандартен размер и напълнете с гореща, но не вряща вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене.

Възрастни и деца над 12-годишна възраст:

1 саше на всеки 4-6 часа, както е указано. Не приемайте повече от 4 сашета на всеки 24-часов период.

Да не се дава на деца под 12 години.

Да не се превишава посочената доза.

Не приемайте това лекарство с алкохолни напитки.

Продължителната употреба на този продукт не се препоръчва. Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължават повече от 3 дни или се влошават.

Ако приемете повече Викс АнтиГрип Комплекс отколкото е необходимо:

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако инцидентно сте приели повече отколкото трябва или ако дадете на дете повече, отколкото е препоръчано, дори ако Вие/детето се чувствате добре, поради риска от сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Викс АнтиГрип Комплекс може да причини нежелани лекарствени реакции, макар че не всеки ги получава.

Ако изпитате някой от следните сериозни нежелани ефекти, незабавно спрете приема на това лекарство и потърсете спешно лекарска помощ.

- Много редки случаи на сериозни кожни реакции са докладвани. Тежки алергични реакции (анафилаксия), хрипове или затруднено дишане може да се появят рядко.



(Редки: засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10 000 души; много редки: засягат по-малко от 1 на 10000 души).

- Много рядко може да се появят някои нарушения на кръвните клетки и панкреатит (възпаление на панкреаса) с парацетамол (засяга по-малко от 1 на 10000 души).

Други нежелани реакции

Честота	Нежелана реакция
Чести (засягат по-малко от 1 на 10 души, но повече от 1 на 100 души)	Загуба на апетит, гадене или повръщане
Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10000 души)	Слаби алергични реакции (като кожни обриви или мехури) Болка в стомаха, диария Главоболие, замаяност Сърцебиене (палпитации), високо кръвно налягане Трудно заспиване (безсъние), нервност, треперене (тремор), раздразнителност, безпокойство, обърканост или тревожност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява под 25°C.

Не приемайте Викс АнтиГрип Комплекс след срока на годност, отбелязан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Викс АнтиГрип Комплекс

Всяко саше от това лекарство представлява единична доза, съдържаща активните вещества: 500 mg парацетамол, 200 mg гвайфенезин и 10 mg фенилефринов хидрохлорид.

Останалите съставки са: захароза, лимонена киселина, винена киселина, натриев цикламат, натриев цитрат, аспартам (E951), ацесулфам калий (E950), ментол на прах, аромат на лимон, аромат на лимонов сок, хинолиново жълто (E104). Вижте края на точка 2.

Как изглежда Викс АнтиГрип Комплекс и какво съдържа опаковката

Викс АнтиГрип Комплекс е почти бял прах, който е опакован в ламинирано саше в картонена опаковка. Продуктът е наличен в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.



Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикълс България ЕООД
ул. Н. В. Гогол 15, ет.1, 1124 София
България

Производител

Wrafter Laboratories Limited Braunton, Devon, EX33 2DL, Обединено кралство

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

Австрия: Influbene Erkältungsgetränk Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

България: Викс АнтиГрип Комплекс 500 mg/200 mg/10 mg прах за перорален разтвор

Чешка Република: Vicks SymptoMed Complete citrón

Германия: Wick Daymed Kombi Erkältungsgetränk

Естония: TriFlunex

Испания: GrippaVicks

Унгария: Grippo Med Wick Citrom izü por belsöleges oldathoz

Ирландия: Paracetamol 500 mg Guaifenesin 200 mg Phenylephrine 10 mg Hydrochloride

Италия: Vicks Flu-Tripla Azione

Литва: Paracetamol/Guaifenesin/ Phenylephrine Wick 500 mg/ 200 mg/10 mg Milteliai geriamajam tripalui

Латвия: TriFlunex 500 mg/200 mg/10 mg Pulveris iekšīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Полша: Vicks AntiGrip Complex

Румъния: Vicks AntiGrip Complex

Обединено кралство: Vicks Cold and Flu Care Daymed Completed Hot Drink

Дата на последно одобрение на листовката

